

Figure 1

Au moins 1 Facteur de risque :
âge \geq 35 ans
ou IMC \geq 25kg/m²
ou ATCD familiaux de diabète au 1^o
ou ATCD personnel de DG
ou ATCD de macrosomie

**A poursuivre
si possible**




Figure 2

Au moins 1 Facteur de risque :
âge \geq 35 ans
ou IMC \geq 25kg/m²
ou ATCD familiaux de diabète au 1^o
ou ATCD personnel de DG
ou ATCD de macrosomie

**Si HGPO impossible
ou refus des patientes**

Début de grossesse

Non

Oui

Mesure de la GAJ

GAJ $<$ 0,92 g/l

0,92-1,25 g/l

\geq 1,26 g/l

DG précoce

Diabète avéré découvert pendant la grossesse

Prise en charge immédiate du DG

24-28 SA

Mesure GAJ et HbA1c

GAJ $<$ 0,92 g/l
et HbA1c $<$ 5.7%

GAJ 0,92-1,25 g/l
ou HbA1c 5.7-6.4%

GAJ \geq 1,26 g/l
ou
HbA1c \geq 6.5%

DG (tardif)

Diabète avéré découvert pendant la grossesse

Prise en charge immédiate + bilan diabète

Prise en charge immédiate du DG

Pas de DG

$>$ 28 SA

Découverte macrosomie ou hydramnios

Non

Oui

Mesure GAJ et HbA1c et/ou début auto-surveillance glycémique d'emblée