

Pensez à parcourir les sites suivants :

- ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/medicaments-et-grossesse/vaccination-et-grossesse
- vaccination-info-service.fr/La-vaccination-au-cours-de-la-vie/Grossesse-et-projet-de-grossesse
- www.has-sante.fr/icms/p_3331263/fr/coqueluche-vacciner-la-femme-enceinte-pour-protger-le-nouveau-ne
- sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_mai-juin23.pdf

Âge approprié	Vaccinations obligatoires pour les nourrissons								4 ans	11-13 ans	14 ans	25 ans	45 ans	65 ans et +
	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois						
BCG														
DTP														Tous les 19 ans
Coqueluche														
Hib														
Hépatite B														
Pneumocoque														
ROR														
Méningocoque C														
Rotavirus														
Méningocoque B														
HPV														
Grippe														Tous les ans
Zona														

Retrouvez toutes ces informations et plus encore en ligne sur le site du réseau : auvergne-perinat.org



Le Réseau de Santé en Périnatalité d'Auvergne promeut l'amélioration de la qualité de la prise en charge des femmes enceintes et de leur enfant en assurant la continuité, la coordination des soins, l'optimisation de l'orientation du patient dans le respect des principes de graduation des soins. Il regroupe les 10 maternités auvergnates, les 3 Centres Périnataux de Proximité, les services de la Protection Maternelle et Infantile, et les professionnels libéraux, adhérents au réseau.



Réseau de Santé en Périnatalité d'Auvergne

Pole F.E.E. - C.H.U Estaiming
1 place Lucie et Raymond Aubrac
63000 CLERMONT-FERRAND

TEL : 04.73.75.05.70



Avant la grossesse

Pensez à faire vérifier votre statut vaccinal auprès de votre médecin traitant

COQUELUCHE

= REPEVAX® ou BOOSTRIX TETRA®
= vaccin **tétravalent** inactivé dTcaPolio
Ce vaccin combiné au vaccin diphtérie, tétanos et poliomyélite, est recommandé systématiquement à l'âge de 25 ans

Vaccins à virus vivant atténué :



Ils sont **CONTRE INDIQUÉS** pendant la grossesse :

Délai d'un mois minimum nécessaire entre la vaccination et le début d'une grossesse

⇒ ROUGEOLE-RUBÉOLE-OREILLONS (ROR)

= PRIORIX® ou M-M-RVAXPRO®
Toute personne née après 1980 a reçu **2 doses** de vaccin ROR (obligatoire)

⇒ VARICELLE

= VARILIX® ou VARIVAX®
En l'absence d'immunité, **2 doses** de vaccins espacées de :

- 4 à 8 semaines pour le VARIVAX®
- 6 à 10 semaines pour le VARILIX®

Pendant la grossesse

COVID

= COMIRNATY® ou SPIKEVAX®

= Vaccins à ARN messenger
En cas d'absence de vaccination avant la grossesse, la vaccination est recommandée **dès le 1^{er} trimestre** de la grossesse

GRIPPE

La vaccination contre la grippe est recommandée aux femmes enceintes, **quelque soit le stade de la grossesse au moment de la campagne vaccinale annuelle**

COQUELUCHE

= REPEVAX® ou BOOSTRIX TETRA®

- **Recommandée à partir du 2^{ème} trimestre de grossesse** : si possible entre **20 et 36** semaines d'aménorrhée
- Vacciner la femme à chacune de ses grossesses

Le but étant la protection du nouveau-né grâce au passage transplacentaire des anticorps de la mère.

Stratégie de coconing

COQUELUCHE

Vaccination en post-partum de la mère si non-vaccinée pendant la grossesse + vaccination de l'entourage

- 1 dose de vaccin dTcaPolio pour les personnes non antérieurement vaccinés
- 1 dose de rappel pour les moins de 25ans si la dernière injection date de plus de 5ans
- 1 dose de rappel pour les plus de 25 ans si la dernière injection date de plus de 10 ans

GRIPPE

Recommandée à l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois qui présentent des facteurs de risque de grippe grave

A retenir :

Anticiper sa grossesse

Aucun vaccins à virus vivant atténué pendant la grossesse

La prescription et la réalisation sont possibles par un médecin une sage femme ou un pharmacien.